

1909

Beitrag zur Biologie des Rotlaufbacillus.



Inaugural-Dissertation

zur Erlangung

der veterinär-medizinischen Doktorwürde

der

vereinigten medizinischen Fakultät

der

Großherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Gießen

vorgelegt von

Walther Stickdorn,
prakt. Tierarzt.



J e n a ,

Gustav Fischer

1909.

Beitrag zur Biologie des Rotlaufbacillus.



Inaugural-Dissertation

zur Erlangung

der veterinär-medizinischen Doktorwürde

der

vereinigten medizinischen Fakultät

der

Großherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Gießen

vorgelegt von

Walther Stickdorn,

prakt. Tierarzt.



Jena,

Gustav Fischer

1909.

Gedruckt mit Genehmigung der vereinigten medizinischen Fakultät

Referent: Professor Dr. Olt.

Sonderabdruck aus dem
Centralblatt f. Bakt. etc. I. Abt. Originale. Bd. L.

Meiner lieben

Mutter und Grossmutter

in Dankbarkeit

gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Von der Beobachtung ausgehend, daß zuweilen im Laboratoriumsversuch gegen solche Rotlaufkulturen, die frisch aus Organen zwar Schutzgeimpfter, jedoch nach einigen Monaten an natürlichem Rotlauf erkrankender Schweine isoliert sind, Sera nicht schützen, die den zu ihrer Herstellung verwandten Stämmen gegenüber höchst wirksam sind, daß aber mit der Zeit nach entsprechender Behandlung dieser Kulturen sich auch gegen sie Schutz erzielen läßt, stellte mir der Leiter des Bakteriologischen und Serum-Institutes zu Landsberg a. W., Herr Dr. Schreiber, die Aufgabe, zu untersuchen, inwiefern Rotlaufstämme von der genannten Eigenschaft künstlich durch Laboratoriumsbehandlung verändert werden können, und ob dabei nur Virulenz- oder aber auch Stammesunterschiede eine Rolle spielen.

Diese Frage ist von praktischer Bedeutung: Zunächst werden diese Umstände bei der Wertbemessung eines herauszugebenden Serums von Wichtigkeit sein. Ein mit solchen nach der einen oder der anderen Seite hin veränderten Stämmen hergestelltes Serum wird ebenfalls Unterschiede gegen Sera aufweisen, die mit originalen, aus dem erkrankten Tier direkt gewonnenen Stämmen bereitet sind; andererseits werden sich auch von den Instituten in Verkehr gebrachten Kulturen je nach der Behandlung verschieden verhalten. Ferner wird bei der großen Anpassungsfähigkeit des Rotlaufbacillus an bestimmte biologische Verhältnisse der Schluß nicht ungerechtfertigt sein, daß wie im Laboratoriumsversuch, so auch bei der natürlichen Infektion die Entstehung von Virulenz- oder von Stammesunterschieden möglich ist.

Meine Untersuchungen erstrecken sich

- A. auf Veränderungen der Virulenz,
- B. auf Veränderungen der Stammeseigentümlichkeiten, bezw. Entstehung von Stammesunterschieden des Rotlaufbacillus.

A. Virulenzveränderungen.

Es ist bekannt, daß nicht alle in der Natur vorkommenden Rotlaufstämme die gleiche Virulenz besitzen. Schreiber (1) weist auf die starken Reaktionen hin, die bei den im Institut zur Immunisierung verwandten Pferden durch bestimmte Stämme ausgelöst werden, und schließt daraus auf eine stellenweise Änderung der Pathogenität des Rotlaufbacillus. Aus diesem Grunde halte in bestimmten Gegenden die durch die Impfkulturen erzeugte aktive Immunität gegenüber der Infektion mit dem dort vorkommenden Rotlaufbacillus nicht vor. — Nach

den Untersuchungen von Olt (2) und Bauermeister (3), die durch Jensen (4), Pitt (5), van Velzen (6) u. a. bestätigt wurden, spielen Virulenzveränderungen bei der natürlichen Infektion eine große Rolle. Man fand nämlich, daß der Rotlaufbacillus im Darm und in den Tonsillen ganz gesunder Schweine fast regelmäßig saprophytisch vegetiert. Ob es zur Erkrankung komme, sei abhängig von der Virulenz der Bakterien, die unter bestimmten Bedingungen zum Schaden des Wirtes gesteigert und entfaltet werden könne.

Ferner führt Preisz (7) die zuweilen ungünstigen Ergebnisse der Lorenzschen Impfung auf die „sehr verschiedene Virulenz“ der angewandten Kulturen zurück. — Nach Prettners (8) Untersuchungen unterliegt die Virulenz des Rotlaufbacillus großen Schwankungen. Ich gebe Stämme, welche erst in der zehnfach größeren Menge Mäuse töten als andere.

Ich prüfte zunächst die Virulenzveränderungen, die der Rotlaufbacillus durch andauernde Passage durch Nährböden erleidet, dann sein Verhalten nach und bei längerer Hindurchschickung durch Tierkörper.

Zu meinen Untersuchungen benutzte ich einen Rotlaufstamm, der aus der Milz eines Ende April 1908 an perakutem Rotlauf gefallenen einige Monate vorher schutzgeimpften Schweines isoliert worden war. In dem betreffenden Bestande ist der Rotlauf nach Angabe des Tierarztes Dr. N. in J. stationär, der durch die Impfung erzielte Schutz halte dort nur kurze Zeit vor.

Die mikroskopische und kulturelle Prüfung des benutzten Rotlaufstammes — nach den in den Institutsprotokollen gemachten Angaben nenne ich ihn R 15 — ergab folgendes: Feine Stäbchen, färbbar nach Gram und mit Anilinfarben. Stichkulturen in Gelatine zeigen das charakteristische Gläserbürstenwachstum. [Das von Lorenz (10) bei hochvirulenten Stämmen beobachtete kugelige Wachstum der Kolonien in Gelatine trifft für den von mir bearbeiteten Stamm also nicht zu.] In Bouillon wird leicht wölkchenartig getrübt, am Boden des Röhrchens bilden sich zopfähnliche, gedrehte Fäden. In Plattenkulturen entstehen blaugraue Trübungen, auf Agar feine, durchsichtige, Taupfropfen ähnliche Beläge. Auf Kartoffel ist kein Wachstum zu beobachten. — Graue und weiße Mäuse, Tauben und Sperlinge, die mit den üblichen Dosen infiziert werden, sterben nach 2—4 Tagen.

Die Virulenz der gewonnenen Kulturen wurde im Institut zunächst an dem gewöhnlichen, zur Rotlaufschutzimpfung verwandten Serum geprüft:

Tabelle I.
(Frühere Virulenzprüfung, den Institutsprotokollen entnommen.)

Datum	Impftiere	Serumdosis in ccm	Kulturdosis in ccm	Resultat
30. Mai 1908 dgl. dgl.	2 w. Mse. dgl. dgl.	0,0066 sk. 0,01 „ 0,015 „	0,01 sk. 0,01 „ 0,01 „	} † 3—4
30. Mai 1908	2 w. Mse.	—	0,01 sk.	

Anmerkung: Die in den Tabellen gebrauchten Abkürzungen bedeuten:

gr. Ms. = graue Hausmaus,
w. Mse. = weiße Mäuse,
Kn. = Kaninchen,

sk. = subkutan,
ip. = intraperitoneal,
† x = tot x Tage nach der Infektion.

Schon diese Prüfung ließ die Annahme berechtigt erscheinen, daß sich im vorliegenden Falle um einen sehr virulenten Stamm handle. Für spricht der schnelle Infektionsverlauf bei den Kontrollen und der Zustand, daß das Serum den Eintritt des Todes bei den Mäusen nicht hindern, sondern nur um 1—2 Tage hinausschieben konnte, während gegen den zu seiner Herstellung benutzten Stamm hinreichend Schutz währte, wie die Vergleichstabelle Ia zeigt:

Tabelle Ia.

Datum	Impftiere	Serumdosis in cem	Kulturdosis in cem	Resultat
26. Mai 1908	2 w. Mse.	0,0066 sk.	0,01 sk.	a) † 4, b) † 7
dgl.	dgl.	0,01 „	0,01 „	a) † 5, b) † 8
dgl.	dgl.	0,015 „	0,01 „	leben
26. Mai 1908	2 w. Mse.	—	0,01 sk.	a) † 2 ¹ / ₂ , b) † 2 ¹ / ₄

Ich wiederholte diese Prüfungen und hatte dasselbe Ergebnis:

Tabelle II.

(Ausgangsstamm R 15.)

Datum	Impftiere	Serumdosis in cem	Kulturdosis in cem	Resultat
3. Sept. 1908	2 gr. Mse.	0,0066 sk.	0,01 sk.	a) † 2 ¹ / ₂ , b) 3
dgl.	dgl.	0,01 „	0,01 „	a) † 2 ¹ / ₂ , b) † 2 ¹ / ₂
dgl.	dgl.	0,015 „	0,01 „	a) † 2 ¹ / ₂ , b) † 3 ¹ / ₂
3. Sept. 1908	2 gr. Mse.	—	0,01 sk.	a) † 2, b) † 2

Während also das Serum gegen den zu seiner Herstellung benutzten Stamm in den Dosen 0,0066 und 0,01 eine beträchtliche Verlängerung Krankheitsverlaufes bewirkte, in der Dosis 0,015 aber sicher schützte, eben nach Infektion mit R 15 die Mäuse ohne Ausnahme in 2 bis 3 Tagen in so unregelmäßigen Abständen, daß daraus ein Schluß auf den welchen Schutz an den Laboratoriumstieren nicht gezogen werden konnte.

Ich suchte nun zunächst die Dosis letalis minima festzustellen, indem ich grauen Mäusen von ca. 15 g Gewicht in immer kleiner werdenden Dosen 2-tägige Bouillonkulturen subkutan applizierte.

Tabelle III.

(Virulenzprüfungen vor der Passage.)

Datum	Impftiere	Impfdosis in cem	Resultat
10. Sept. 1908	2 gr. Mse.	0,001	a) † 1 ³ / ₄ , b) † 1 ³ / ₄
dgl.	dgl.	0,000001	a) † 2 ¹ / ₂ , b) † 3
dgl.	dgl.	0,0000001	a) † 3 ¹ / ₄ , b) † 4
dgl.	dgl.	0,00000001	leben
dgl.	dgl.	0,000000001	leben

Die kleinste eben noch tödliche Dosis für den benutzten Ursprungstamm lag also bei 0,0000001 cem.

Ich schritt nun zunächst zur Untersuchung des Ausgangsstammes bei Passagen durch Nährböden.

I. Nährbödenpassage.

Nach Friedberger (9) tritt selbst bei Verwendung von Nährböden, die in ihrer Zusammensetzung den Substraten am meisten entsprechen, auf denen pathogene Bakterien ihr natürliches Fortkommen finden, auch bei häufiger Ueberimpfung, durch die eine Erschöpfung des Nährbodens oder die Bildung schädlicher Stoffwechselprodukte ausgeschlossen ist, doch mit der Zeit eine Virulenzabnahme ein. Friedberger erklärt dies mit einer allmählichen Anpassung der ursprünglich parasitisch veranlagten Bakterien an die saprophytische Lebensweise. So soll z. B. für den Diphtheriebacillus oder für Rotz eine längere künstliche Züchtung auf Nährböden die Kulturen ihrer krankheits-erregenden Fähigkeit berauben.

Nach Lorenz (10) kann sich der Rotlaufbacillus je nach dem Nährboden nicht unerheblich an Virulenz verändern, so daß er seine Pathogenität für Mäuse und Tauben vollständig einbüßt.

Als Nährböden benutzte ich abwechselnd Agar und Bouillon. Die Bouillon wurde hergestellt, indem eine bestimmte Menge Pferdefleisch zerkleinert im Verhältnis 1:3 mit Wasser versetzt und mazeriert wurde. Nach dem Zusatz von 0,2 Proz. Pepton wurde das Gemisch dann gekocht und filtriert, danach nochmals sterilisiert. Der Schrägagar wurde ebenfalls unter Zusatz von 1 Proz. Pepton und 0,5 Proz. NaCl bereitet.

Das Umstechen von Agar auf Bouillon und umgekehrt geschah regelmäßig in Intervallen von 2 Tagen, 38mal in einer Zeit von 80 Tagen. Die Kulturen zeigten auf Agar wie in Bouillon immer das typische Wachstum des Rotlaufbacillus. Eine nach dem 22. Umstechen vorgenommene Virulenzprüfung der Nährbödenpassagen ergab folgendes:

Tabelle IV.
(Virulenzprüfungen während der Nährbödenpassage.)

Datum	Impftiere	Kulturdosis in ccm	Resultat
3. Nov. 1908	2 gr. Mse.	0,0001 sk.	a) † 2 $\frac{1}{2}$, b) † 2 $\frac{1}{2}$
dgl.	dgl.	0,000001 „	a) † 3 $\frac{1}{2}$, b) † 4
dgl.	dgl.	0,0000001 „	leben

Während also vor der Passage 0,0000001 ccm graue Mäuse 3—4 Tagen töteten, genügt diese Dosis schon nach 4 Wochen nicht mehr, wohl aber 0,000001 ccm. Bis zum Ende der Passage verminderte sich die Virulenz noch weiter, wie Tabelle V zeigt. Ich nenne den durch Nährbödenpassage erhaltenen Stamm im folgenden RN.

Tabelle V.
(Virulenzprüfungen nach der Nährbödenpassage.)

Datum	Impftiere	Kulturdosis in ccm	Resultat
25. Nov. 1908	2 gr. Mse.	0,0000001 sk.	leben
dgl.	dgl.	0,000001 „	„
3. Dez. 1908	dgl.	0,00001 „	„
dgl.	dgl.	0,0001 „	a) † 3 $\frac{3}{4}$, b) † 4

Die Dosis letalis minima liegt nunmehr erst bei 0,0001 ccm. Virulenzabnahme scheint also nicht direkt proportional der Züchtungsdauer, sondern einem Vielfachen derselben vor sich zu gehen,

Es es bei der immer größer werdenden Virulenzverminderung nach Prenz (l. c.) wohl möglich sein würde, den Rotlaufbacillus bald ganz seiner Virulenz zu berauben.

In der Tat kam es während der im 2. Teil meiner Arbeit niedergelegten Versuche in kurzer Zeit dahin, daß trotz häufigen Umstechens (alle 1—2 Tage) von Bouillon auf Bouillon der benutzte Stamm, RN, seine Virulenz vollständig einbüßte. Obwohl die Kulturen auf Agar, Gelatine und in Bouillon das üppigste Wachstum zeigten, konnten schließlich selbst Dosen von 0,1 und 0,5 ccm eine graue Maus nicht mehr töten.

Bei Haltung auf nur einem Nährboden (Bouillon) unter optimalen Bedingungen scheint also die Anpassung an die saprophytische Lebensweise (Friedberger l. c.) noch schneller vor sich zu gehen, als bei Umstechen auf zwei verschiedenen Substraten (Bouillon und Agar).

II. Tierpassagen.

Die Veränderungen, die der Rotlaufbacillus durch Tierpassagen erfährt, sind zuerst von Pasteur (11) untersucht worden. Er fand, daß durch Kaninchenpassage die Virulenz des Rotlaufbacillus abgeschwächt, durch Taubenpassage jedoch gesteigert wird, und baute auf dieser Tatsache seine Schutzimpfungsmethode auf.

Prettners (12) Prüfungen ergaben, daß die Virulenz des Rotlaufbacillus durch Taubenpassage für Schweine und Mäuse gesteigert, durch Mäuse- und Kaninchenpassage für Schweine verringert wird. Ferner werde die Virulenz für Mäuse durch ihren eigenen Körper abgeschwächt, für Tauben ebenso beibehalten.

Zur Passage verwandte ich wieder den Stamm R 15 und ließ ihn durch weiße Mäuse und Tauben gehen.

a) Mäusepassage.

Nachdem die Virulenz des Ausgangsstammes an grauen Mäusen festgestellt war (cf. Tabelle III), schickte ich ihn 17mal hintereinander durch weiße Mäuse. Diese wurden jedesmal mit derselben Dosis, die dem Vielfachen der Dosis letalis minima entsprach, nämlich 0,01 ccm Kultur, infiziert, und zwar intraperitoneal. Nach dem Tode des Versuchstieres wurde jedesmal durch den Sektionsbefund (Obstipatio, Connectivitis, Milztumor, parenchymatöse Degeneration von Leber, Herz, Nieren) und durch mikroskopische Untersuchung von Milzpulpaausstrichen das Vorhandensein einer Mischinfektion oder anderer Todesursachen als Abtlauf ausgeschlossen. Dann wurde aus dem Herzblute eine neue Bouillonkultur angelegt und diese nach 2-tägiger Aufbewahrung im Brutbrank bei 36° an das nächste Tier weiterverimpft. Zuweilen wurden sie verwandten und auf ihre Reinheit untersuchten Kulturen nochmals in Bouillon auf Bouillon umgestochen.

Aus Tabelle VI läßt sich weder eine Abnahme, noch eine Zunahme der Virulenz folgern. Der verhältnismäßig kurze Verlauf der Infektion in $1\frac{3}{4}$ —2 Tagen findet sich wie bei den ersten, so auch bei den letzten Versuchstieren. Der Umstand, daß einige Mäuse erst nach 3 und $3\frac{1}{2}$ Tagen starben, läßt sich nur durch eine gewisse individuelle Disposition der betreffenden Tiere erklären. Jedenfalls läßt Tabelle VI nicht eine derartige Virulenzabnahme erkennen, wie sie Prettners (l. c.) Versuche ergaben. Prettner fand nämlich, daß bei Mäusepassagen des Rotlaufbacillus die Mäuse bis zur 4. Generation binnen $2\frac{1}{2}$ Tagen, während

der 5.—7. nach 3—4, nach 9—10 Generationen erst in 4—5 Tagen starben.

Tabelle VI.
(Mäusepassage.)

Lfd. No.	Datum	Dosis	Resultat
1	11. Sept. 1908	0,01	a) + $1\frac{3}{4}$, b) + 2
2	15. " "	0,01	a) + 2, b) + $2\frac{1}{2}$
3	19. " "	0,01	a) + 2, b) + $2\frac{1}{2}$
4	23. " "	0,01	a) + $2\frac{1}{2}$, b) + 3
5	28. " "	0,01	a) + 2, b) + 3
6	3. Okt. "	0,01	a) + $2\frac{1}{2}$, b) + $3\frac{1}{4}$
7	8. " "	0,01	a) + $1\frac{3}{4}$, b) + 2
8	12. " "	0,01	a) + 2, b) + 2
9	16. " "	0,01	a) + 2, b) + 2
10	21. " "	0,01	a) + 2, b) + $2\frac{1}{4}$
11	26. " "	0,01	a) + $2\frac{1}{4}$, b) + $3\frac{1}{4}$
12	2. Nov. "	0,01	a) + $3\frac{1}{4}$, b) + $3\frac{1}{4}$
13	8. " "	0,01	a) + $2\frac{1}{4}$, b) + $2\frac{1}{4}$
14	15. " "	0,01	a) + $2\frac{1}{4}$, b) + $2\frac{1}{4}$
15	22. " "	0,01	a) + $1\frac{3}{4}$, b) + $2\frac{1}{2}$
16	29. " "	0,01	a) + 2, b) + $2\frac{1}{4}$
17	6. Dez. "	0,01	a) + 2, b) + $2\frac{1}{2}$

Mit dem aus der Mäusepassage gewonnenen Stamm, den ich mit RMs bezeichnen werde, stellte ich — wie oben mit RN — zwei Virulenzprüfungen an: eine nach der 12., eine andere nach der 17. Ueberimpfung.

Tabelle VII.
(Virulenzprüfung von RMs während der Passage.)

Datum	Impftiere	Dosis in ccm	Resultat
8. Nov. 1908	2 gr. Mse.	0,001	a) + $1\frac{3}{4}$, b) + $2\frac{1}{4}$
dgl.	dgl.	0,000001	a) + $3\frac{1}{2}$, b) + $3\frac{3}{4}$
dgl.	dgl.	0,0000001	leben

Im Vergleich zu Tabelle III zeigt sich eine geringe Abnahme der Virulenz. Die Dosis letalis minima ist von 0,0000001 auf 0,000001 ccm gestiegen. Die Prüfung von RMs nach der Beendigung der Passage ist in Tabelle VIII niedergelegt.

Tabelle VIII.
(Virulenzprüfung von RMs nach der Passage.)

Datum	Impftiere	Dosis in ccm	Resultat
3. Dez. 1908	2 gr. Mse.	0,00001	a) + $3\frac{1}{4}$, b) + 4
dgl.	dgl.	0,000001	+ $4\frac{1}{2}$
9. Dez. 1908	dgl.	0,0000001	leben
dgl.	dgl.	0,00000001	"

Die kleinste tödliche Dosis hat sich also auf 0,000001 ccm gehalten. Im ganzen ergibt sich demnach eine geringe Abnahme der Virulenz des Rotlaufbacillus durch Mäusepassage, nicht so sehr für die weißen, als für die grauen Mäuse.

b) Taubenpassage.

Nach Prettners (l. c.) Angaben verhalten sich Tauben der Rotlauf-
 ektion gegenüber sehr verschieden. Nach seinen und Kitts Unter-
 suchungen bleibt zwar die Virulenz für Tauben durch Taubenpassage
 erhalten und wird in der gleichen Weise für Mäuse gesteigert, jedoch
 zeigen sich die Tiere sehr verschieden empfänglich, je nach der indivi-
 duellen Disposition, dem Alter, der Rasse und der Haltung. Ich ver-
 suchte nach seinen Vorschlägen möglichst junge, veredelte und im
 Hühnerstall gefütterte Tauben, denen ich 0,1 ccm einer 2-tägigen Kultur in
 den Brustmuskel injizierte. Zuweilen (bei älteren oder Feldtauben) gab
 es auch höhere Dosen bis 0,5 ccm.

Ich schickte die Kulturen hintereinander durch 12 Tauben. Die
 Tiere zeigten nach 1—2 Tagen Freßunlust, schließlich plötzliche Anfälle
 von Atemnot und verendeten in kurzer Zeit. Die Sektion ergab haupt-
 sächlich parenchymatöse Degeneration der großen Organe; besonders
 die Leber um das Doppelte bis Dreifache vergrößert und wies
 Rotlaufbacillen in großer Menge auf. Aus dem Herzblute wurde wie
 bei der Mäusepassage eine Bouillonkultur angelegt und mit dieser nach
 üblicher Aufbewahrung im Brutschrank die nächste Taube intramuskulär
 injiziert.

Tabelle IX.
 (Taubenpassage.)

Lfd. No.	Datum	Dosis	Resultat	Bemerkung
1	11. Sept. 1908	0,1	† 3	sehr alte Tb. (ca. 8 J.)
2	16. " "	0,1	lebt	
	22. " "	1,0	† 2 ¹ / ₂	
2a	22. " "	0,1	† 2 ¹ / ₂	
3	27. " "	0,1	† 2 ¹ / ₂	große Tb. Mischrasse bekommt am
4	2. Okt. "	0,1	† 1 ³ / ₄	
5	6. " "	0,1	† 2 ¹ / ₄	
6	11. " "	0,1	† 2 ¹ / ₄	
7	16. " "	0,1	† 3	
8	2. Nov. "	0,5	† 1 ³ / ₄	
9	16. " "	0,2	† 2 ¹ / ₂	
10	23. " "	0,2	lebt	
	27. " "	0,5	† 1 ³ / ₄	
11	1. Dez. "	0,1	† 2 ¹ / ₂	
12	8. " "	0,1	† 2 ³ / ₄	

Aus dem Vorstehenden lassen sich manche interessante Einzelheiten
 entnehmen: Der Infektionsverlauf bei den Tauben 1, 2a, 3 und 4 zeigt
 eine deutliche und regelmäßige Steigerung der Virulenz für Tauben,
 deren Ursache ich in dem Umstand vermute, daß alle 4 Tiere demselben
 Hühnerstall und derselben Zucht entstammten, also von Natur eine ziemlich
 gleichartige Disposition gegenüber der Erkrankung besaßen. Die Krank-
 heitsdauer bei den übrigen Tieren ist sehr verschieden, doch bleibt bei
 einer Dosis 0,1 ccm der Durchschnitt mit 2¹/₂ Tagen bis zum Schluß be-
 stehen. Eine Abweichung der Taube 8 von dieser Norm liegt nicht vor,
 da gemäß der höheren Dosis ist der Verlauf ein schnellerer. Während
 aber bei No. 9 0,2 ccm nicht anders wirken, als sonst 0,1 ccm, tötet
 diese Dosis bei No. 10 überhaupt nicht, so daß ich zu einer höheren —
 0,5 ccm — greifen mußte. Prettners Angaben also, daß Tauben sich
 gegen Rotlaufbacillus gegenüber sehr ungleichmäßig verhalten, und daß

die Virulenz für Tauben durch Taubenpassage weder erhöht noch vermindert wird, kann ich bestätigen.

Den aus der Taubenpassage gewonnenen Stamm — ich nenne ihn im folgenden RT — prüfte ich hinsichtlich seiner Virulenz wieder an grauen Mäusen. Eine erste Prüfung nahm ich nach der 8. Passage eine zweite nach der 12. vor.

Tabelle X.
(Virulenzprüfung von RT während der Passage.)

Datum	Impftiere	Dosis in ccm	Resultat
6. Nov. 1908	2 gr. Mse.	0,0001	a) + 2 $\frac{1}{2}$, b) + 2 $\frac{1}{2}$
dgl.	dgl.	0,000001	a) + 3 $\frac{1}{4}$, b) + 3 $\frac{1}{2}$
dgl.	dgl.	0,0000001	a) + 4 $\frac{3}{4}$, b) + 4 $\frac{3}{4}$
13. Nov. 1908	dgl.	0,00000001	leben

Tabelle XI.
(Virulenzprüfung von RT nach der Passage.)

Datum	Impftiere	Dosis in ccm	Resultat
8. Dez. 1908	2 gr. Mse.	0,000001	+ 4
dgl.	dgl.	0,0000001	} + 5—6
dgl.	dgl.	0,00000001	

Während aus Tabelle X eine Virulenzsteigerung nicht zu folgern ist — die Dosis letalis minima betrug vor der Passage ebenfalls 0,0000001 — ist am Ende derselben noch 0,000000001 ccm imstande, eine Maus zu töten. Demnach wird, wie auch Prettner (l. c.) festgestellt hat, die Virulenz des Rotlaufbacillus durch Taubenpassage für Mäuse erhöht.

III. Untersuchungen über Virulenzveränderungen des Rotlaufbacillus durch Mischinfektion mit *Bacterium coli commune*.

Im Anschluß an die Untersuchungen, die Veränderungen der Virulenz des Rotlaufbacillus durch Passagen betrafen, stellte ich noch solche an, die die Beeinflussung des Rotlaufbacillus durch *Bacterium coli commune* zum Gegenstand hatten.

Dazu wurde ich durch Herrn Direktor Dr. Schreiber veranlaßt, der mich auf die Tatsache aufmerksam machte, daß sich zuweilen an den Organen von Schweinen, die trotz der Schutzimpfung an Rotlauf eingegangen sind, nach Verimpfung auf graue Mäuse nicht nur Rotlaufbacillen isolieren lassen, sondern auch virulente Coli-Bakterien, die imstande sind, in Reinkultur an Mäuse verimpft, diese in einigen Tagen zu töten, daß also zuweilen Mischinfektionen mit Coli-Bakterien bei Rotlauf eine Rolle zu spielen scheinen. Ich unterzog mich deshalb der Aufgabe, zu prüfen, in welcher Weise sich Rotlaufbacillus und *Bacterium coli commune* des Schweines beeinflussen können. Der Umstand, daß die Rotlaufinfektion vom Darm aus geschieht, läßt die Annahme einer Mischinfektion des nach Olt u. a. (l. c.) im Darm gesunder Schweine fast regelmäßig vorkommenden Rotlaufbacillus mit dem gewöhnlichsten aller Darmbakterien (Heinick, 13) als nicht unwahrscheinlich erscheinen.

Ueber das Verhalten zweier verschiedener Bakterienarten bei Mischinfektion liegen zahlreiche Beobachtungen vor: Nach Friedberger (l. c.)

nn die Virulenz gesteigert werden durch gleichzeitige Mitverimpfung derer, auch unter Umständen gar nicht krankheitsregender Bakterien-ten, ja selbst durch gleichzeitige Einverleibung abgetöteter Keime oder ihrer Stoffwechselprodukte von Bakterien. Auch Wassermann (14) stellte fest, daß durch Bakterienassoziationen die Virulenz gesteigert werden kann. Monti (15) zeigte, daß die gleichzeitige Einverleibung in sterilen *Proteus*-Kulturen die Virulenz von *Pneumo*-, *Strepto*- und *Staphylokokken* erhöht. Roux und Yersin (16) fanden, daß bei der gleichzeitigen Injektion von *Streptokokken* und einer abgeschwächten sich allein nicht mehr tödlichen *Diphtheriekultur* die Meerschweinchen rasch an *Diphtherie* zugrunde gingen, und schlossen daraus, daß die *Streptokokken* einen erhöhenden Einfluß auf die Virulenz des *Diphtherie-bacillus* ausüben.

Versuche über Mischinfektionen mit *Bacterium coli commune* liegen vor von Sanarelli (17), Blachstein und Zumft (18), Agrò (19), Levy und Thomas (20); diese ziehen aus ihren Experimenten den Schluß, daß Mischinfektionen mit *Bacterium coli* die Virulenz von *Typhus* und *Cholera* steigern. Ueber Assoziationen des *Bacterium coli commune* mit dem *Rotlaufbacillus* konnte ich in der Literatur keine Angaben finden.

Da ich zu meinen Untersuchungen nicht Schweine benutzen konnte, wählte ich zu Versuchstieren Mäuse und prüfte zunächst, wie diese sich bei einer *Coli*-Infektion allein gegenüber verhielten.

Dem Darne eines geschlachteten gesunden Schweines in der Gegend der Ileocökalklappe entnahm ich mit steriler Oese etwas Darmschleim, der in Bouillon durch Umschütteln verteilt wurde. Mit diesem Material wurden Platten gegossen, aus denen sich die *Coli*-Kolonieen leicht abheben ließen. Die gewonnenen Bakterien zeigten ganz das von Scherich und Pfandl (21) für das *Bacterium coli commune* des Menschen mitgeteilte Verhalten:

Plumpe, gerade Stäbchen mit abgerundeten Enden, mit Ziehlschem Farbfuchsin leicht färbbar, nicht nach Gram. Auf Agar wachsen sie spig als blaßgelbliche, leicht gelappte Kolonieen, auf Kartoffel als erst gelber, dann „erbsenpüreefarbiger“, später graubraun verfärbter Belag. Sterile Milch wird nach 48-stündiger Aufbewahrung im Brutschrank zur Gerinnung gebracht. In peptonisierter Bouillon entsteht bald eine gleichmäßige, starke Trübung; Bouillon mit Traubenzuckerzusatz läßt Bläschenentwicklung und Gasbildung erkennen. Allmählich nehmen die Kulturen einen eigentümlichen, nicht fauligen Geruch an.

Da als Versuchstiere nur solche in Betracht kamen, die auch für Rotlauf empfänglich sind — das dem *Bacterium coli* gegenüber sehr empfindliche Meerschweinchen mußte ich also ausschließen — prüfte ich die erhaltenen Kulturen zunächst an grauen Mäusen. Die Tiere wurden mit 2-tägigen Bouillonkulturen subkutan infiziert.

Tabelle XII.

Datum	Impftiere	Dosis in cem	Resultat
7. Nov. 1908	2 gr. Mse.	0,01 sk.	} alle tot nach 2—3 Tagen
dgl.	dgl.	0,001 „	
dgl.	dgl.	0,0001 „	

Da ich Versuchen mit noch kleineren Dosen wegen der durch die starken Verdünnungen hervorgerufenen unvermeidlichen Fehler aus dem Wege gehen wollte und mit möglichst wenig virulentem Material zu arbeiten gezwungen war, versuchte ich es mit weißen Mäusen. Diese sollen nach Escherich (22) gegen kleinere Dosen unempfindlich sein, was meine Versuche bestätigten. Weiße Mäuse blieben nach subkutaner Einverleibung von 0,01 und selbst 0,1 cem Coli-Kulturen immer am Leben. Zu meinen Versuchen konnte ich also 0,01 cem als für sich allein nicht mehr tödliche Dosis verwenden.

Schwieriger lagen die Verhältnisse bei den Rotlaufkulturen. Auch dem oben bei der Prüfung der Coli-Kulturen angeführten Grunde konnte ich die für weiße Mäuse doch so hochgradig pathogenen Rotlaufbacillen nicht ohne weiteres injizieren. Auch eine Abschwächung der Kulturen bis zum Verlust der Virulenz, wie sie Roux und Yersin (1. c.) beim Diphtheriebacillus anwandten, erschien mir wegen der Abweichung von den natürlichen Verhältnissen nicht vorteilhaft.

Deshalb immunisierte ich zunächst weiße Mäuse passiv mit einem vom Pferde gewonnenen Rotlaufschutzserum und injizierte einige Stunden später intraperitoneal 0,01 cem einer Rotlauf- und sofort danach 0,01 cem Coli-Kultur subkutan (Tabelle XIV). Um einen genauen Vergleich zu ermöglichen, ließ ich einen Versuch nebenhergehen, der sich von dem beschriebenen nur dadurch unterschied, daß nach der Seruminjektion nur Rotlauf-, keine Coli-Kulturen einverleibt wurden (Tabelle XIII). Aus einer Nebeneinanderstellung der erhaltenen Resultate mußte sich ergeben, ob das Mitverimpfen einer nicht tödlichen Coli-Dosis die Rotlaufimmunität benachteiligt oder nicht.

Tabelle XIII.
(Einfache Rotlaufinfektion.)

Datum	Impftiere	Serumdosis in cem	Kultur	Resultat
17. Nov. 1908 dgl. dgl.	2 w. Mse. dgl. dgl.	0,0066 sk. 0,01 „ 0,015 „	0,01 Rotlauf- kultur intra- peritoneal	a) + 3 $\frac{1}{2}$, b) + 6 a) + 5, b) + 6 a) + 3 $\frac{1}{2}$, b) + 5
17. Nov. 1908	2 w. Mse.	Kontrollen		a) + 1 $\frac{3}{4}$, b) + 2

Tabelle XIV.
(Rotlauf + Coli.)

Datum	Impftiere	Serumdosis in cem	Kulturen	Resultat
17. Nov. 1908 dgl. dgl.	2 w. Mse. dgl. dgl.	0,0066 sk. 0,01 „ 0,015 „	0,01 Rotlauf- kultur ip. + 0,01 Coli sk.	a) + 2 $\frac{1}{2}$, b) + 5 $\frac{1}{2}$ a) + 2 $\frac{1}{2}$, b) + 3 $\frac{1}{2}$ a) + 2 $\frac{3}{4}$, b) + 6
17. Nov. 1908	2 w. Mse.	Kontrollen		a) + 1 $\frac{3}{4}$, b) + 1 $\frac{3}{4}$

Zunächst fällt auf, daß die Wahl des benutzten Rotlaufstammes insofern eine unglückliche war, als das Serum auch gegen ihn allein in den angeführten Dosen in keinem Falle schützte, obwohl es gegen den zu seiner Herstellung verwandten Stamm ausreichenden Schutz bot, wie ich den Institutsprotokollen entnehmen konnte. Als Analogon verweise ich auf die Tabellen II und III.

Dennoch zeigt ein Vergleich beider Tabellen, daß die mit Rotlauf und Coli geimpften Mäuse durchschnittlich früher starben als die nur mit Rotlauf infizierten: Während von jenen 3 in 2—3, 1 in 3—4 Tagen und 2 noch später starben, verendeten von diesen nur 2 in 3—4, 4 erst 4—6 Tagen. Die Reihen weisen ferner eine große Unregelmäßigkeit auf, die ich zunächst einer zu großen Virulenz des Rotlaufstammes zuschreibe (die Kontrollen in Tabelle XIII starben in $1\frac{3}{4}$ bzw. 2 Tagen!). Ferner glaube ich, daß das injizierte Serum auf die ebenfalls subkutan verabreichten Coli-Kulturen durch seinen Gehalt an Karbolglyzerin Entwicklungshemmend gewirkt hat, eine Annahme, die dadurch unterstützt wurde, daß sich in den Organen der eingegangenen Mäuse nur Rotlaufbacillen, nie Coli-Bakterien fanden.

Ich wiederholte daher den Versuch mit der Maßgabe, daß ich diesmal einen weniger virulenten Rotlaufstamm verwandte, etwas höhere Serum Dosen gab und die Coli-Kulturen intraperitoneal wie die Rotlaufkulturen einverleibte. Vorher prüfte ich die Pathogenität des *Bacterium coli commune* für weiße Mäuse bei intraperitonealer Applikation und fand, daß 0,1 zuweilen, 0,01 ccm nie imstande war, eine weiße Maus zu töten.

Tabelle XV.
(Einfache Rotlaufinfektion.)

Datum	Impftiere	Serumdosis in ccm	Kultur	Resultat
Dez. 1908 dgl. dgl.	2 w. Mse. dgl. dgl.	0,01 sk. 0,015 „ 0,02 „	} 0,01 Rotlauf- kultur ip.	} leben sämtlich
Dez. 1908	1 w. Ms.	Kontrolle		† $2\frac{1}{4}$

Tabelle XVI.
(Rotlauf + Coli.)

Datum	Impftiere	Serumdosis in ccm	Kulturen	Resultat
Dez. 1908 dgl. dgl.	2 w. Mse. dgl. dgl.	0,01 sk. 0,015 „ 0,02 „	} 0,01 Rotlauf- kultur ip. + 0,01 Coli ip.	a) † 4, b) † 7 a) † $2\frac{1}{4}$, b) † 4 leben
Dez. 1908	1 w. Ms.	Kontrolle		† $1\frac{1}{4}$
Dez. 1908	1 w. Ms.	Kontrolle	nur 0,01 Coli ip.	lebt

Vergleicht man beide Tabellen, so fällt auf, daß in Tabelle XV die Kontrolle in $2\frac{1}{4}$, in Tabelle XVI schon in $1\frac{1}{4}$ Tagen starb, ferner, daß das Serum vollen Schutz gewährte gegen die Alleininfektion mit Rotlauf, gegen die Mischinfektion aber nur in der größten Dosis (0,02).

Es ergibt sich also, daß gegen Rotlauf passiv immunisierte weiße Mäuse einer einfachen Rotlaufinfektion leichter widerstehen als einer Mischinfektion von Rotlauf- und Coli-Bakterien, mit anderen Worten: Durch eine Mischinfektion wird die Rotlaufimmunität nachteilig beeinflusst, so, daß eine geringgradige Immunität (hervorgerufen durch die kleinen Serumdosen) bei einer gleichzeitigen Infektion mit *Bacterium coli*

commune nicht vorhält, sondern nur eine hochgradige (der größeren Serumdosierung entsprechend).

Die Frage, ob diese Verhältnisse nicht nur für die Infektion weißer Mäuse, sondern auch für die von Schweinen Geltung haben, wäre nur durch umfangreiche Versuche an Schweinen zu beantworten. Es würde sich dabei erweisen, ob die Coli-Infektion ein Moment ist, das die Virulenz des saprophytisch im Darmlumen lebenden Rotlaufbacillus zu erhöhen bzw. eine bestehende Rotlaufimmunität abzuschwächen imstande ist.

B. Stammverschiedenheiten.

Die folgenden Versuche stellte ich an, um zu prüfen, ob sich die im ersten Teil der Arbeit beschriebenen, durch verschiedene Passage — Nährböden, Mäuse und Tauben — erhaltenen und in ihrer Virulenz sehr ungleichen Rotlaufstämme nur eben durch ihre Virulenz oder auch noch durch ein anderes biologisches Verhalten unterscheiden, mit anderen Worten, ob sie gegeneinander Stammverschiedenheiten aufweisen. Stammverschiedenheit nenne ich zwei Stämme, wenn ein durch Immunisierung mit dem ersten hergestelltes Serum gegen den zweiten nicht schützt, umgekehrt.

Am bekanntesten sind die Stammverschiedenheiten des *Bacterium coli commune* des Menschen, das nach Pfaundler (23) sogar für identisch mit dem *Bacterium typhi* gehalten wurde, weil Typhusserum gegen eine etwas höhere Dosis Coli-Kulturen schützt, um vice versa. Ferner ist es die natürliche Verschiedenheit der Stämme, die beim *Bacillus suisepitici* die Herstellung eines immer wirksamen Serums so schwierig macht.

Was die Stammverschiedenheiten betrifft, die der Rotlaufbacillus durch Anpassung an bestimmte biologische Verhältnisse, z. B. an die Lebensbedingungen einer bestimmten Tierart, annimmt, so ist zunächst auf den sogenannten *Bacillus murisepticus* hinzuweisen. Wie Kitt (24) mitteilt, sind zwar zwischen Rotlauf- und Mäuseseptikämiebacillus geringe morphologische und kulturelle Unterschiede festgestellt worden, jedoch spreche die von Lorenz ermittelte Tatsache, daß rotlaufimmune Kaninchen auch gegen Mäuseseptikämie Immunität gewinnen und umgekehrt Kaninchen, die Mäuseseptikämie überstanden, immun gegen Rotlauf waren, für die Identität oder wenigstens Rasseverwandtschaft beider Bakterien. Neuerdings hat Schipp (25) gefunden, daß zwei morphologisch, färbetorisch und kulturell dem Schweinerotlaufbacillus vollkommen gleichende Bakterien, α und β , der eine beim Rinde eine seuchenartige Erkrankung, der andere bei Hühnern ein Massensterben hervorruft. Biologisch soll der *Bacillus* α dem Schweinerotlauf sehr fernstehen, vom *Bacillus* β ist noch nicht entschieden, ob er mit dem *Bacillus erysipelatis* identisch, oder ob er nur eine Stammverschiedenheit oder Virulenzvarietät ist.

Daß der von mir behandelte Rotlaufstamm durch die Nährböden Mäuse- und Taubenpassage eine Veränderung erfahren hatte, zeigt mir nicht nur die Virulenzprüfungen für die erhaltenen Stämme (RN, RMs und RT), sondern auch das Verhalten derselben in Gelatinestichen. Es ergab sich nämlich, daß alle 3 Stämme auf dem genannten Nährboden ein anderes Aussehen hatten. RN und RT zeigten zwar beide das typische Gläserbürstenwachstum, doch während RT schärfer

gesetzte, vom Stichkanal nach allen Seiten kurz ausstrahlende Kolonien bildete, verschwammen bei RN die etwas längeren Strahlen bald ineinander, so daß die Kolonien das Bild einer den Stichkanal umgebenden wolkigen Trübung aufwiesen. RMs dagegen zeigte das Gläserfüßtenwachstum überhaupt nicht, sondern bildete mehrere kugelige, in der Stichrichtung etwas plattgedrückt erscheinende Kolonien, aus denen nach 6 Tagen zum Teil feine, zarte, verzweigte Fäden, wie Würzelchen, nach der Peripherie zu wuchsen. Auf Agar-Agar wie auf Bouillon zeigten alle 3 Stämme das gleiche Aussehen. Auch morphologisch und inkultoriell ließen sie sich nicht voneinander unterscheiden.

Das eigentümliche verschiedene kulturelle Verhalten der Passagenstämme auf Gelatine schien mir eine nähere Untersuchung darüber, ob sie untereinander derartig stammverschieden sind, daß ihre Sera gegen sie wechselseitig verschieden schützen, noch mehr zu rechtfertigen.

Der Plan, den ich den folgenden Untersuchungen zugrunde legte, war der, daß ich mit den 3 Stämmen Kaninchen immunisierte und die von ihnen gewonnenen Sera einzeln gegen die verschiedenen Stämme ausspielte. Zum Vergleich bediente ich mich noch eines vierten Rotlaufstammes — nach den Institutsprotokollen nenne ich ihn R 36 — der aus der Milz eines an perakutem Rotlauf gefallenem Schweines isoliert war und noch keine Passagebehandlung durchgemacht hatte. Eine mit ihm vorgenommene Virulenzprüfung an grauen Mäusen ergab als kleinste sicher tödliche Dosis 0,000001 ccm einer 48-stündigen Kultur.

Tabelle XVII.
(Virulenzprüfung R 36.)

Datum	Impftiere	Dosis in ccm	Resultat
1. Dez. 1908	2 gr. Mse.	0,00001 sk.	} † 3 ^a / ₄ —4 ¹ / ₂
dgl.	dgl.	0,000001 "	
25. Nov. 1908	dgl.	0,0000001 "	a) † 7, b) lebt
dgl.	dgl.	0,00000001 "	

Mit den 4 Stämmen immunisierte ich Kaninchen in steigenden Dosen.

Tabelle XVIII.
R 36—Kn I und Ia.

Abzeichen: Beide Ohren rot.
Gewicht: 1925 g.

No.	Datum	Kulturdosis	Art der Impfung	Bemerkungen
I	1. Nov. 1908	0,01	subkut.	† nach 5 Tagen. Bakt. u. Sektionsbefund: Rotlauf
Ia	7. Nov. 1908 Gew. 2000 g	0,001	subkut.	Erkrankt nach 7 Tagen unter Darm- und Lähmungserscheinungen. Erholt sich wieder
Ia	21. Nov. 1908	0,1	"	
Ia	27. " 1908	0,1	intraper.	
Ia	3. Dez. 1908	0,5	"	

Kn Ia entblutet am 11. Dez. 1908.
Gewicht: 1950 g.

Tabelle XIX.
RN—Kn II.

Abzeichen: Linkes Ohr rot.
Gewicht: 1950 g.

Datum	Dosis in ccm	Art der Impfung
1. Nov. 1908	0,01	subkutan
8. " "	0,1	"
16. " "	0,1	intraperitoneal
25. " "	0,5	"

Entblutet am 3. Dez. 1908. Gewicht: 2450 g.

Tabelle XX.
RMs—Kn III.

Abzeichen: Rechtes Ohr rot.
Gewicht: 1950 g.

Datum	Dosis	Art der Impfung
1. Nov. 1908	0,01	subkutan
8. " "	0,1	"
15. " "	0,1	intraperitoneal
22. " "	0,5	"

Entblutet am 30. Nov. 1908. Gewicht: 2250 g.

Tabelle XXI.
RT—Kn IV.

Ohne Abzeichen. Gewicht: 2000 g.

Datum	Kulturdosis	Art der Impfung
6. Nov. 1908	0,01	subkutan
13. " "	0,1	"
21. " "	0,1	intraperitoneal
1. Dez. "	0,5	"

Entblutet am 9. Dez. 1908. Gewicht: 2520 g.

Das beim Entbluten in sterilen Reagensgläsern gewonnene Blut ließ ich absetzen und pipettierte das Serum ab. Um Volumveränderungen des Serums zu vermeiden, wandte ich als Konservierungsmittel statt des gebräuchlichen Karbolglyzerins das von Emmerich (26) und Kronacher (27) untersuchte und empfohlene Diaphtherin oder Oxychinaseptol an (0,1 g auf 100 g Serum).

Die vier erhaltenen Sera, die ich nach ihren Stämmen SR 36, SRN, SRMs und SRT nennen will, prüfte ich nunmehr an grauen Mäusen gegen die zu ihrer Herstellung verwandten Rotlaufstämme. Nach Marx' (28) Methode gab ich den grauen Mäusen erst das Serum subkutan, dann nach 24 Stunden, um dem Immunkörper des Serums genügend Zeit zur Aktivierung zu lassen, 2-tägige Kulturen, jedoch nicht intraperitoneal, sondern analog den vorhergegangenen Virulenzprüfungen subkutan. Ich injizierte von jedem Stamme zunächst die ungefähr der 1000-fachen Dosis letalis minima entsprechende Kulturmenge, d. h. von RMs 0,001, von RN 0,1, von RT 0,001, von R 36 0,001 ccm. Als sich während der ersten Versuche herausstellte, daß einerseits die gewonnenen Sera ziemlich wirksam waren, andererseits aber die Virulenz der Kulturen sich verminderte, steigerte ich die Kulturdosen noch um das 10-fache, d. h. 0,01 ccm bei RMs, RT und R 36. Wie schon oben erwähnt (cf. Tabelle V usw.), sank die Virulenz von RN trotz 1- bis

ägigen Umstechens von Bouillon auf Bouillon und trotz des üppigsten Wachstums auf diesem Substrat so schnell, daß bald 0,5 ccm nicht mehr imstande waren, die Kontrollen zu töten, ich also gezwungen war, 1 Serumprüfungen gegen diesen Stamm ganz abzusehen.

Tabelle XXII.

(Prüfung von mit SRMs immunisierten Mäusen gegen RMs, RN, RT und R 36.)

Datum	Impftiere	Serumdosis	Stamm und Kulturdosis	Resultat
12. Dez. 1908 dgl.	2 gr. Mse. dgl.	SRMs 0,1 " 0,05	RMs 0,001 dgl.	} leben † 3
29. Dez. 1908 dgl.	dgl.	" 0,025	RMs 0,01 dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	" 0,01 —	dgl.	
12. Dez. 1908 dgl.	2 gr. Mse. dgl.	SRMs 0,1 " 0,05	RN 0,1 dgl.	} leben
29. Dez. 1908 dgl.	dgl.	" 0,025	RN 0,5 dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	" 0,01 —	dgl.	
12. Dez. 1908 dgl.	2 gr. Mse. dgl.	SRMs 0,1 " 0,05	RT 0,001 dgl.	} leben † 2 ³ / ₄
29. Dez. 1908 dgl.	dgl.	" 0,025	RT 0,01 dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	" 0,01 —	dgl.	
12. Dez. 1908 dgl.	2 gr. Mse. dgl.	SRMs 0,1 " 0,05	R 36 0,001 dgl.	} leben † 2
29. Dez. 1908 dgl.	dgl.	" 0,025	R 36 0,01 dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	" 0,01 —	dgl.	

Tabelle XXIII.

(Prüfung von mit SRN immunisierten Mäusen gegen RT, R 36, RMs.)

Datum	Impftiere	Serumdosis	Stamm und Kulturdosis	Resultat
14. Dez. 1908 dgl.	2 gr. Mse. dgl.	SRN 0,1 " 0,05	RT 0,001 dgl.	} leben † 3
4. Jan. 1909 dgl.	dgl.	" 0,025	RT 0,01 dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	" 0,01 —	dgl.	
14. Dez. 1908 dgl.	2 gr. Mse. dgl.	SRN 0,1 " 0,05	R 36 0,001 dgl.	} leben † 3
4. Jan. 1909 dgl.	dgl.	" 0,025	R 36 0,01 dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	" 0,01 —	dgl.	
14. Dez. 1908 dgl.	2 gr. Mse. dgl.	SRN 0,1 " 0,05	RMs 0,001 dgl.	} leben † 3
4. Jan. 1909 dgl.	dgl.	" 0,025	RMs 0,01 dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	" 0,01 —	dgl.	

Tabelle XXIV.

(Prüfung von mit SRT immunisierten Mäusen gegen RT, R36, RMs. und RN.)

Datum	Impftiere	Serumdosis	Stamm und Kulturdosis	Resultat
18. Dez. 1908	2 gr. Mse.	SRT 0,025	RT 0,001	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 2 $\frac{3}{4}$
4. Jan. 1909	2 gr. Mse.	" 0,025	RT 0,01	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 3
18. Dez. 1908	2 gr. Mse.	SRT 0,025	R36 0,001	a) + 6, b) + 7
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	a) + 7, b) lebt
4. Jan. 1909	2 gr. Mse.	" 0,025	R36 0,01	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 2
18. Dez. 1908	2 gr. Mse.	SRT 0,025	RMs. 0,001	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 3 $\frac{1}{2}$
4. Jan. 1909	2 gr. Mse.	" 0,025	RMs. 0,01	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 4
18. Dez. 1908	2 gr. Mse.	SRT 0,025	RN 0,1	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	

Tabelle XXV.

(Prüfung von mit SR36 immunisierten Mäusen gegen R36, RMs., RN, und RT.)

Datum	Impftiere	Serumdosis	Stamm und Kulturmenge	Resultate
22. Dez. 1908	2 gr. Mse.	SR36 0,025	R36 0,001	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 2 $\frac{1}{2}$
9. Jan. 1909	2 gr. Mse.	" 0,025	R36 0,01	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 2 $\frac{3}{4}$
22. Dez. 1908	2 gr. Mse.	SR36 0,025	RMs. 0,001	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 3 $\frac{1}{2}$
9. Jan. 1909	2 gr. Mse.	" 0,025	RMs. 0,01	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 3 $\frac{1}{2}$
22. Dez. 1908	2 gr. Mse.	SR36 0,025	RN 0,1	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	
22. Dez. 1908	2 gr. Mse.	SR36 0,025	RT 0,001	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 2 $\frac{1}{2}$
9. Jan. 1909	2 gr. Mse.	" 0,025	RT 0,01	} leben
dgl.	dgl.	" 0,01	dgl.	
dgl.	1 gr. Ms.	—	dgl.	+ 2 $\frac{1}{4}$

Aus den Tabellen XXII—XXV ergibt sich, daß die Passagenstämm irgendwelche Stammesverschiedenheiten untereinander nicht aufweisen. Ein mit dem einen hergestelltes Serum schützt immer gegen den anderen. Auch das durch Immunisierung mit dem Vergleichsstamm R36 gewonnene

erum schützte immer gegen die übrigen Stämme. Die Sera der Passagen-
 ämme dagegen gewährten in einem Falle keinen vollkommenen Schutz
 gegen R 36, wie aus Tabelle XXIV ersichtlich ist, indem SRT nur den
 Verlauf der Infektion mit R 36 auf 6—7 Tage verlängerte. Da dies
 immerhin eine Beeinflussung von R 36 durch SRT bedeutet und ja
 nicht alle Tiere der Infektion erlagen, läßt sich nach den Tab. XXII
 -XXV das Vorhandensein besonderer Stammeseigentümlichkeiten für
 die 4 Versuchsstämme verneinen.

Da während der Zeit von der ersten Immunisierung der Kaninchen
 bis zu den letzten Prüfungen über 2 Monate verstrichen waren und
 R 36 während dieser Zeit ebenfalls 1—2 Tage nach Bedarf auf Bouillon
 neu umgestochen wurde, lag die Vermutung nahe, daß auch dieser Stamm
 bei den letzten Prüfungen nicht mehr original war, sondern sich ähnlich
 wie RN, nur nicht in demselben Grade, zu einem „Nährbodenpassagen-
 Stamm“ umgewandelt habe. Deshalb hielt ich es für vorteilhaft, die
 Sera nochmals zu prüfen, und zwar an einer möglichst originalen Rot-
 tufkultur. Als solche stand mir wiederum R 36 zur Verfügung, mit der
 Aufgabe, daß dieser Stamm durch die im Institut zur gleichmäßigen
 Erhaltung der Virulenz angewandte Aufbewahrungsmethode sich ziem-
 lich gleich geblieben war, wie einige orientierende Vorversuche ergaben.
 Zur Kontrolle ließ ich eine Virulenzprüfung nebenhergehen.

Tabelle XXVI.
 (Virulenzprüfung von R 36.)

Datum	Impftiere	Dosis R 36	Resultat
16. Jan. 1909	2 gr. Mse.	0,01 sk.	a) † 2, b) † 2 ¹ / ₂
dgl.	dgl.	0,00001 „	a) † 3, b) † 3 ¹ / ₄
dgl.	dgl.	0,000001 „	a) † 3 ¹ / ₄ , b) lebt
dgl.	dgl.	0,0000001 „	leben

Die Dosis letalis minima ist sich also ziemlich gleich geblieben (cf.
 Tabelle XVII) und beträgt wie früher 0,000001 ccm. Ich prüfte nunmehr
 die 4 Sera SR36, SRN, SRMs, SRT gegen den beschriebenen Stamm R 36.

Tabelle XXVII.

(Prüfung von mit SR36, SRN, SRMs und SRT immunisierten Mäusen gegen den
 originalen Stamm R 36.)

Datum	Impftiere	Serum und Dosis	Kultur	Resultat
16. Jan. 1909	2 gr. Mse.	SR 36—0,0066	R 36 0,01	} leben a) lebt, b) fällt aus
dgl.	dgl.	„ —0,01	dgl.	
dgl.	dgl.	„ —0,015	dgl.	
16. Jan. 1909	2 gr. Mse.	SRN—0,0066	R 36 0,01	} leben a) † 6, b) lebt
dgl.	dgl.	„ —0,01	dgl.	
dgl.	dgl.	„ —0,015	dgl.	
16. Jan. 1909	2 gr. Mse.	SRMs—0,0066	R 36 0,01	a) † 5, b) † 7 a) † 6, b) † 6 leben
dgl.	dgl.	„ —0,01	dgl.	
dgl.	dgl.	„ —0,015	dgl.	
16. Jan. 1909	2 gr. Mse.	SRT—0,0066	R 36 0,01	a) † 4, b) † 6 a) † 4, b) † 7 ¹ / ₂ leben
dgl.	dgl.	„ —0,01	dgl.	
dgl.	dgl.	„ —0,015	dgl.	
16. Jan. 1909	2 gr. Mse.	—	R 36 0,01	a) † 2, b) † 2 ¹ / ₄

Wie die Tabelle wiederum zeigt, besitzen die 4 Kaninchensera eine
 hervorragende Schutzkraft, die der eines Pferdeserums nicht nachsteht,
 sondern sie eher noch übertrifft. Ich erkläre mir dies nach der Ehrlich-

schen Theorie damit, daß das Serum vom Kaninchen als das eines für den Rotlauf empfänglichen Tieres besonders geeignete Komplemente in größerer Menge im Mäusekörper vorfindet, als das des von Natur rotlaufimmunen Pferdes.

Der Schutz, den die 4 Sera bewirken, ist jedoch nicht gleich stark. Es zeigt sich, daß SR 36 am besten gegen den eigenen Stamm schützt, da alle Mäuse am Leben bleiben (mit einem Ausfall, dessen Ursache in einer interkurrierenden Krankheit zu suchen war); fast ebenso wirksam ist SRN, das nur in einem Falle in der kleinsten Dosis nicht schützt. Dann folgen SRMs und SRT, die nur in der größten Dosis — 0,015 ccm — die Impftiere am Leben erhalten. Dies ist um so eigentümlicher, als die Stämme RMs und RT doch an Virulenz RN bedeutend übertrafen. Ueber die Frage, ob dieser seltsame Umstand in einem besonderen individuellen Verhalten des betreffenden Serumtieres seinen Grund hat oder in anderen Ursachen, lassen die Versuche keinen Schluß zu.

Jedenfalls kann auf Grund von Tabelle XXVII das Bestehen von Stammesunterschieden bei den benutzten Stämmen nicht behauptet werden, da in der Dosis 0,015 ccm alle Sera gegen R 36 Schutz gewährten.

Es ist somit aus der vorliegenden Arbeit der Schluß zu ziehen, daß längere Laboratoriumsbehandlung auf die Rotlaufkulturen von großem Einfluß ist, so daß es sich für die Immunisierungstechnik bei Rotlauf empfehlen würde, nur möglichst originale, nicht veränderte Kulturen und nur mit solchen hergestellte Sera zu verwenden.

Ergebnisse.

1) Die Virulenz des Rotlaufbacillus wird durch lange Nährbödenpassage (Bouillon und Agar) allmählich herabgesetzt. Die Virulenzabnahme erfolgt nicht gleichmäßig: Sie nimmt mit der Züchtungsdauer zu und kann schließlich zum vollständigen Verlust der Virulenz für Mäuse führen.

2) Nach Passage durch weiße Mäuse bleibt die Virulenz für weiße Mäuse erhalten, für graue wird sie um ein geringes herabgesetzt.

3) Durch Taubenpassage wird die Virulenz des Rotlaufbacillus für diese Tierart beibehalten, für graue Mäuse aber erhöht.

4) Gegen Rotlauf passiv immunisierte weiße Mäuse, die einer einfachen Rotlaufinfektion widerstehen, sterben bei gleichzeitiger Injektion einer für sich allein nicht tödlichen Dosis von Kulturen des *Bacterium coli commune* des Schweines.

5) Die durch längere Nährböden-, Mäuse- und Taubenpassagen erhaltenen Rotlaufstämme unterscheiden sich auffallend durch ihr Wachstum in Gelatinestichen.

6) Stammesunterschiede des Rotlaufbacillus lassen sich durch künstliche Passagebehandlung nicht erzeugen. Die mit den Passagestämmen hergestellten Sera schützen gegen ihre Kulturen wechselseitig.

Zum Schluß spreche ich Herrn Dr. Schreiber für die freundliche Ueberlassung des Materials und die bereitwillige Unterstützung meiner aufrichtigsten Dank aus.

Literatur.

- Schreiber, Vortrag gehalten auf der 79. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Dresden. (Dtsche tierärztl. Wochenschr. Jahrg. XV. No. 49.)
- Olt, Dtsche tierärztl. Wochenschr. 1901. p. 41.
- Bauermeister, Arch. f. wissenschaftl. Tierheilk. Bd. XXVIII. p. 66.
- Jensen, Maanedsskrift for Dyrlaeger, Ref. in d. Berl. tierärztl. Wochenschr. 1902. No. 1.
- Pitt, Inaug.-Diss. Gießen. 1907.
- van Velzen, Inaug.-Diss. Bern. 1908.
- Preis, Immunität beim Rotlauf der Schweine. (Handb. d. path. Mikroorg. von Kolle-Wassermann. Bd. IV. 1903. p. 1242.)
- Prettner, Der derzeitige Stand der tierärztlichen Schutzimpfungen usw. (Tierärztl. Centralbl. 1906. No. 17—19.)
- Friedberger, Die allgemeinen Methoden der Bakteriologie. (Handb. d. path. Mikroorg. Bd. I. p. 516.)
- Lorenz, Bericht auf dem internationalen tierärztl. Kongreß Baden-Baden. 1899.
- Pasteur et Thuillier, Compt. rend. de l'Acad. de sc. T. XCVII.
- Prettner, Das Rotlaufschutz- und Heilserum. (Tierärztl. Centralbl. 1906. No. 21—23.)
- Heinick, Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierheilk. 1903. p. 489.
- Wassermann, Misch- und Sekundärinfektion. (Handb. d. path. Mikroorg. von Kolle-Wassermann. Bd. I. 1903. p. 321.)
- Monti, Atti d. R. Accad. dei Lincei. 1889.
- Roux et Yersin, Ann. Pasteur. 1891.
- Sanarelli, zitiert nach Kolle-Wassermann, Handb. f. path. Mikroorg. Bd. I. p. 321.
- Blachstein u. Zumft, zitiert nach Kolle-Wassermann, Handb. f. path. Mikroorg. Bd. I. p. 321.
- Agrò, zitiert nach Kolle-Wassermann, Handb. d. path. Mikroorg. Bd. I. p. 321.
- Levy u. Thomas, zitiert nach Kolle-Wassermann, Handb. d. path. Mikroorg. Bd. I. p. 321.
- Escherich u. Pfaundler, Bacterium coli commune. (Handb. d. path. Mikroorg. von Kolle-Wassermann. Bd. II. p. 334.)
- Escherich, zitiert in Kolle-Wassermann, Handb. d. path. Mikroorg. Bd. II. p. 382.
- Pfaundler, Spezielle Immunitätslehre betr. Bacterium coli commune. (Handb. d. path. Mikr. Bd. IV. p. 907.)
- Kitt, Bakterienkunde und pathologische Mikroskopie. 1892. p. 289.
- Schipp, Ref. in d. Berl. tierärztl. Wochenschr. 1908. No. 44.
- Emmerich, L'Oxyquinaseptol ou Diaphthérine, Antiseptique nouveau.
- Kronacher, De l'emploi d'Oxychinaseptol (Diaphthérine).
- Marx, Die Wertbestimmung des Schweinerotlaufserums. (Dtsche tierärztl. Wochenschr. 1901. No. 6.)

Lebenslauf.

Am 29. August 1883 wurde ich, Gustav Hermann Walther Stickdorn, als Sohn des Kaufmannes Robert Stickdorn und seiner Gattin Luise geb. Schulz zu Bünde in Westf. geboren. Nachdem ich 4 Jahre in Landsberg a. W. die Bürgerschule besucht hatte, trat ich Ostern 1893 in die Sexta des Kgl. humanistischen Gymnasiums ebenda ein, bestand Ostern 1903 das Maturitätsexamen und widmete mich dem Studium der Tierheilkunde. Die ersten vier Semester erledigte ich in Berlin, das fünfte in München und das sechste und siebente wiederum in Berlin. In Berlin bestand ich am 29. Oktober 1904 die naturwissenschaftliche Prüfung und am 7. August 1907 das Staatsexamen. Nach erlangter Approbation war ich zunächst Vertreter des Tierarztes Herrn Söffner in Vietz, dann des Tierarztes Herrn Schünemann in Ludwigsruh. Seit dem 1. November 1907 versee ich selbständig die Praxis und Fleischschau in Fichtwerder bei Döllensradung. Außerdem beschäftige ich mich vom 1. Juni 1908 ab im nahen Landsberg a. W. im Bakteriologischen und Seruminstitut von Dr. Schreiber mit bakteriologischen Arbeiten.

Fichtwerder, den 25. Januar 1909.

Walther Stickdorn,
prakt. Tierarzt.
